NOIDIO® GOLD 10 EC

FUNGICIDA SISTEMICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PARTICOLARMENTE INDICATO CONTRO OIDIO DEL PESCO, DELLA VITE, DEL TABACCO E DI NUMEROSE ALTRE COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE:	Penconazolo puro	10,2% (= 100 g/L)
FORMULAZIONE:	Concentrato emulsionabile	
CLASSIFICAZIONE:	Attenzione	H226; H361d; H411; EUH 401
REGISTRAZIONE:	Ministero della Salute n. 11926 del 04.02.2004	
CONFEZIONI:	Flacone da 250 ml Bottiglia da 1 L	Cartone 24x250 ml Cartone 12x1 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE

NOIDIO® GOLD 10 EC è un fungicida sistemico caratterizzato da una elevata azione preventiva, curativa e bloccante contro diversi funghi: l'Oidio del Pesco, della Vite, del Tabacco e di numerose colture orticole, ornamentali e da fiore. ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** viene assorbito velocemente dalle piante (a seconda delle colture e delle temperature da 1 a 6 ore). L'assorbimento del prodotto e la successiva sistemicità a livello ottimale si hanno con temperature di 20°C e con vegetazione in attiva crescita. Contro la Ticchiolatura il prodotto esplica una azione retroattiva sino a 96-100 ore.

VANTAGGI

NOIDIO® GOLD 10 EC agisce all'interno della pianta e, raggiunta la completa penetrazione non può più essere dilavato da piogge successive al trattamento. L'attività del ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** si esplica nel contatto tra il fungo e gli organi vegetali inibendo la formazione degli austori. ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** è selettivo per l'entomofauna utile ed è suggerito nei programmi di difesa integrata.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dosi di impiego per Hl	Note
Vite	Oidio	ml 25-30	**Trattamenti preventivi:** In pre-post fioritura intervenendo ogni 14-16 gg
		ml 15-20	In pre-post fioritura intervenendo ogni 7-10 gg
		ml 50	**Con attacchi di Oidio in atto (primi sintomi):** Effettuare due trattamenti ad intervalli di 5-7 gg continuare poi con i trattamenti di tipo preventivo.
Pesco	Oidio	ml 40-50	**Trattamenti preventivi:** In aree ad alta pressione di infezione oidica e su varietà sensibili intervenire dalla caduta dei petali ad intervalli di 10-14 gg. In aree a bassa pressione trattare ogni 14-21 gg se necessario intervenire in presenza dei primi sintomi. Usare le dosi più elevate contro Monilia, Bolla e Corineo. Il ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** esplica una azione collaterale sufficiente se sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
	Malattie da conservazione (*Monilia fructigena, Penicillium* spp.)	ml 50	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta.
Melone, Zucchino, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Pisello	Oidio	ml 25-50	In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 interventi ad intervalli di 14-16 gg a seconda della coltura e della pressione di infezione oidica.

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	**Avversità**	**Dosi di impiego per Hl**	**Note**
Pomodoro e Peperone (solo in pieno campo)	Oidio	ml 25-50	In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 interventi ad intervalli di 14-16 gg a seconda della coltura e della pressione di infezione oidica. Su Pomodoro e Peperone effettuare al massimo 2 interventi.
Colture ornamentali e da fiore	Oidio, Ruggini	ml 25-50	Intervenire ogni 10-14 gg a seconda della coltura e della pressione delle infezioni oidiche. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diversa sensibilità si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
Tabacco	Oidio	ml 35-50	Effettuando 2-4 trattamenti preventivi alla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 gg

AVVERTENZE - CONSIGLI UTILI

Le dosi si riferiscono all'impiego di attrezzature a volume normale. Il ***NOIDIO® GOLD 10 EC*** va diluito nella quantità di acqua sufficiente a bagnare bene la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

SU TUTTE LE COLTURE SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.