DELTAMIX® 25

INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

COMPOSIZIONE: Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile
CLASSIFICAZIONE: Pericolo H226; H302; H304; H318; H332; H335; H336; H400; H410; EUH066; EUH401
REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 16181 del 09.12.2014
CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE

Il ***DELTAMIX®25*** è un insetticida piretroide a base di un solo isomero allo stato puro, la deltametrina, particolarmente attiva anche a dosi estremamente basse per ettaro. ***DELTAMIX®25*** agisce su molti insetti sia per ingestione che per contatto e la sua azione è immediata e duratura.
Se ne consiglia l'impiego su tutta la vegetazione alla comparsa delle infestazioni. Su colture difficili da bagnare (con foglie e frutti ricchi di pruina, cere) è opportuno aggiungere alla miscela insetticida uno specifico bagnante-adesivo.

VANTAGGI

DELTAMIX®25 è un insetticida molto versatile sia perché protegge numerose colture sia perché è attivo contro un ampio spettro di insetti. Il profilo tossicologico del ***DELTAMIX®25*** ne consente l'impiego sulle principali colture fino a 3 giorni prima del raccolto nonostante la sua persistenza d'azione vada ben oltre. ***DELTAMIX®25*** è quindi un insetticida che rispetta l'ambiente, la coltura, l'operatore ed il consumatore finale.
Per la sua particolare ed innovativa formulazione ***DELTAMIX®25*** è inodore e non imbratta: perciò può essere utilizzato su colture eduli sia in pieno campo che in serra.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dosi di impiego per Hl	Note
FRUTTICOLTURA (Melo, Pero, Pesco, Albicocco)	Afide verde Melo, Afide del Pesco	ml 30-50	Vedi etichetta
	Antonomo - Maggiolino, Tentredini, Tripidi, Cecidomidi, Mosca della frutta	ml 30-50	
	Capua, Cacoecia ed altri tortricidi	ml 30-50	
	Cidia - Anarsia	ml 50-70	
	Cocciniglia di S. Josè	ml 50-75	Nei trattamenti estivi contro neanidi mobili
	Carpocapsa	ml 30	Vedi etichetta
	Microlepidotteri del Melo e del Pero	ml 30-50	
	Psilla	ml 75	
Vite	Piralide, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio	ml 30-50	Vedi etichetta
	Tignole	ml 40-60	
Olivo	Mosca delle Olive	ml 50	Nei trattamenti preventivi
	Saissetia	ml 40-60	Intervenire in estate contro le neanidi mobili
	Tignola, Tripide	ml 50	

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	**Avversità**	**Dosi di impiego per Hl**	**Note**
Orticoltura (carciofo, cavoli cappucci, lattughe ed insalate (escluso la scarola e le baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, patate, fragole)	Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Casside, Tignola, Mosca e Depressaria	ml 50	Vedi etichetta
	Dorifora, Altiche, Cavolaia, Nottue, Tripidi, Tentredini	ml 30	
Frumento, Orzo	Afidi vettori del Nanismo Giallo	0,3-0,5 L/Ha	Trattamenti autunnali ripetere se necessario il trattamento dopo 15 gg
Frumento	Nottue, Tripidi, Afidi del Frumento	ml 30	Trattamenti primaverili-estivi
	Cimici	ml 50	
Mais	Nottue, Tripidi	ml 30	Trattamenti primaverili-estivi
	Afidi. Cimici, Piralide, Diabrotica	ml 50	
Colza	Altiche, Meligete	ml 30	Vedi etichetta
	Afidi, Punteruoli	ml 50	
Tabacco	Nottue, Afidi, Tripidi, Pulce	0,3-0,5 L/Ha	Vedi etichetta
Cotone (solo per uso tessile)	Nottue, Piralide, Tignola, Cicalina, Tripidi, Lygus	ml 30	Vedi etichetta
Pioppo (in vivaio)	Gemmaiola, Tarlo Vespa	ml 50	Vedi etichetta
	Criptorrinco	ml 100	Trattamenti localizzati al tronco
Pioppo (in piantagione)	Criptorrinco	ml 100	
	Saperda	ml 200	Vedi etichetta
	Crisomelidi defogliatori	ml 30-50	
Erba medica	Cavallette*	ml 500 per ettaro	Intervenendo sui ricacci 5-10 gg dopo lo sfalcio
Floricoltura • **in campo** • **in serra**	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino	ml 50	Vedi etichetta
	Tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode)	ml 50-100	
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra	Afidi, Cimice del Platano, Larve di Lepidotteri e Maggiolino	ml 50	Vedi etichetta

* vedere etichetta per le limitazioni d'uso

COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI

DELTAMIX®25 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Per miscelare con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto, preventivamente diluita in acqua, alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA E FRUMENTO; 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA; 7 GIORNI SU OLIVO, PORRO E PATATA, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.