


# ISOMEXX®

**DISERBANTE DI POST-EMERGENZA  
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI  
PER COLTURE DI FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, SEGALE E TRITICALE**

<b>COMPOSIZIONE:</b>	Metsulfuron metile	20%
<b>FORMULAZIONE:</b>	Microgranuli idrodispersibili	
<b>CLASSIFICAZIONE:</b>	Attenzione  H410; EUH401	
<b>REGISTRAZIONE:</b>	Ministero della Salute n. 14756 del 11.12.2009	
<b>CONFEZIONI:</b>	Flacone con dosatore da 60 g	Cartone 8x10x60 g



© Marchio registrato e prodotto originale NUFARM

## CARATTERISTICHE

**ISOMEXX®** è un dicotiledonidica di post-emergenza dei cereali a base di Metsulfuron metile, molecola appartenente alla famiglia delle sulfoniluree. Agisce sulle malerbe presenti al momento del trattamento inibendo la sintesi dell'enzima acetolattato sintetasi (ALS) bloccando la crescita e provocandone la progressiva devitalizzazione.

**Infestanti sensibili:** Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Ruchetta (*Diplotaxis* spp.), Camomilla (*Matricaria* spp.), Falsa camomilla (*Anthemis* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Senape (*Sinapis* spp.), Rapistro rugoso (*Rapistrum rugosum*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Viola (*Viola tricolor*) e Veronica (*Veronica persica*)

**Infestanti mediamente sensibili:** Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Correggiola (*Polygonum aviculare*).

## VANTAGGI

Precipitazioni atmosferiche successive ad una ora dalla applicazione ed **ISOMEXX®** non influenzano l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti. **ISOMEXX®** ha su tutte le colture consigliate un impiego molto flessibile: può essere utilizzato per un lungo periodo senza essere influenzato dalle temperature..

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Epoca d'impiego	Dosi di impiego per Ha	Note
Frumento tenero e duro, Orzo, Segale, e Triticale	post-emergenza dallo stadio di 3 foglie (BBCH 13) fino alla levata (BBCH 39)	15-20 g	Vedi etichetta

## CONSIGLI UTILI - COMPATIBILITÀ - AVVERTENZA

Distribuire la dose indicata con un volume di acqua pari a 300-600 l/ha. La dose minore va impiegata su infestanti e colture poco sviluppate o in abbinamento con altri dicotiledonidici ad azione complementare: es. fenossiderivati (MCPA, ecc.) idrossibenzenitrili (Bromoxynil), Fluroxypyr. **ISOMEXX®** può essere inoltre applicato unitamente ai principali gramincidi di post-emergenza senza particolari manifestazioni di antagonismo. Si ottiene una migliore attivazione del prodotto qualora piova entro 2 settimane dall'applicazione. Non usare in miscela con fertilizzanti.

Numero massimo di applicazione su cereali: 1 applicazione/anno alla dose di 20 g/ha di **ISOMEXX®**. Non applicare su frumento ed orzo da traseminare con essenze foraggere.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.