MULTI

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERDIBILI PER DRUPACEE (SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO, ORZO), ORTAGGI (MELONE, ZUCCHINO, PEPERONE E CARCIOFO)

COMPOSIZIONE: Tebuconazolo 25%
FORMULAZIONE: Granuli idrodisperdibili
CLASSIFICAZIONE: Attenzione H361d; H319; H410; EUH401
REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 15653 del 20.12.2012
CONFEZIONI: Astuccio da 1 Kg Cartone 10x1 Kg

CARATTERISTICHE

Fungicida in granuli idrodisperdibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Il ***MULTI*** viene rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Il ***MULTI*** agisce sui patogeni bloccando lo sviluppo del fungo interferendo nella biosintesi degli steroli siti nella membrana cellulare.

VANTAGGI

Il rapido assorbimento del ***MULTI*** da parte della vegetazione consente il suo impiego anche in concomitanza ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto il prodotto, penetrando all'interno delle piante, si ripara dall'effetto dilavante delle piogge. Il prodotto non interferisce sull'entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in quanto nei loro confronti non c'è nessuna azione tossica e/o repellente.

MODALITÀ DI IMPIEGO					
Coltura	**Parassita**	**Dose max (g/hL)**	**Dose max (kg/ha)**	**N. trattamenti**	**Volume d'acqua L/ha**
Susino	Monilia, Botrite, Oidio, Ruggine	112.5	1.125	2	1.000-1.500
Vite	Oidio	40	0.4	3	1.000
Ortaggi (melone, zucchino)	Oidio	50	0.5	4	800-1.000
Ortaggi (peperone, carciofo)	Oidio	50	0.5	3	800-1.000
Cereali (frumento, orzo)	Oidio, Mal del piede, Ruggini, Rincosporiosi, Septoria, Fusariosi	112.5	1.125	2	1.000-1.500

CONSIGLI UTILI - COMPATIBILITÀ - INTERVALLO DI SICUREZZA

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Il ***MULTI*** non è compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordolese, i Polisolfuri, Calce, ecc.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER MELONE, CARCIOFO, ZUCCHINO, PEPERONE; 7 GIORNI PER SUSINO; 14 GIORNI PER VITE; 28 GIORNI PER FRUMENTO; ORZO SOSPENDERE ALLA FINE DELLA FIORITURA.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.