PRETIL®

FUNGICIDA DI CONTATTO CON PROPRIETÀ TRANSLAMINARI CHE ESPLICA LA SUA ATTIVITÀ BIOLOGICA INIBENDO NEI FUNGHI PATOGENI SENSIBILI LA SECREZIONE DEGLI ENZIMI NECESSARI AL PROCESSO DI INFEZIONE

COMPOSIZIONE:	Pyrimethanil puro	36,7% (= 400 g/L)
FORMULAZIONE:	Sospensione concentrata	
CLASSIFICAZIONE:	In corso di registazione	
REGISTRAZIONE:	In corso di registazione	
CONFEZIONI:	Sacco da 1 L	Cartone 12x1 L

NOVITÀ!

® Marchio registrato INDUSTRIAS AFRASA S.A.

CARATTERISTICHE

PRETIL® è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari. ***PRETIL®*** contiene Pyrimethanil, appartenente alla famiglia chimica delle anilinopirimidine ed attivo principalmente contro la muffa grigia della vite e delle altre colture agrarie. ***PRETIL®*** esplica la sua attività biologica inibendo nei funghi patogeni sensibili la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione.

VANTAGGI

In virtù del suo caratteristico meccanismo d'azione ***PRETIL®*** risulta attivo anche verso ceppi fungini poco sensibili ad altri antibotritici.
Il profilo ecotossicologico di ***PRETIL®***, rispetta gli insetti utili e i fitoseidi, rendendolo idoneo all'impiego nei programmi di lotta integrata.
Non agisce negativamente sulla fermentazione del mosto e non altera le caratteristiche organolettiche del vino.

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	**Avversità**	**Dosi di impiego**	**Note**
Vite da vino e da tavola	Botrite	L 2,0-2,5 per Ha pari a 200-250 ml/hl	Vedi etichetta
Lattuga	Botrite	L 2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hl	
Pomodoro	Botrite	L 2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hl	
Fragola (pieno Campo)	Botrite	L 2,0-2,5 per Ha pari a 200-250 ml/hl	
Fragola (serra)	Botrite	L 1,5-2,0 per Ha pari a 150-200 ml/hl	

COMPATIBILITÀ – CONSIGLI UTILI - AVVERTENZE

PRETIL® non è miscibile con preparati a reazione alcalina o con preparati contenenti: alluminio (per es. fungicidi a base di fosetil-Al), calcio o magnesio. In caso di miscela con altri formulati si raccomanda l'impiego di un agitatore.
Qualora si dovesse miscelare ad altri prodotti è consigliabile effettuare prove preliminari.
Preparare la miscela fungicida stemperando prima la dose in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una miscela omogenea, versare nell'irroratrice e portare a volume normale con l'ausilio dell'impianto di agitazione.
Nel caso di trattamenti con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha, su vite e ortaggi, fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori, fare riferimento alla dose per ettolitro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU FRAGOLA E POMODORO; 14 GIORNI SU LATTUGA; 21 GIORNI SU VITE.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.