



## STIMOLATORE DI IMPOLLINAZIONE ATTIRA LE API SULLE COLTURE IN FIORITURA

<b>COMPOSIZIONE:</b>	Miscela di sostanze di origine naturale
<b>FORMULAZIONE:</b>	Microincapsulata
<b>CLASSIFICAZIONE:</b>	Non pertinente
<b>REGISTRAZIONE:</b>	Non richiesta
<b>CONFEZIONI:</b>	Bottiglia da 1 L                      Cartone 12x1 L



® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

### CARATTERISTICHE

**sulFIORE®** contiene una miscela di sostanze di origine naturale con una importante e riconosciuta capacità di attirare le Api mellifere. Il prodotto è formulato con una elevata ed avanzata tecnologia attraverso un processo di **microincapsulazione** che permette il lento rilascio delle sostanze attrattive e non una rapida evaporazione delle stesse. Ne consegue che l'effetto che attrae gli insetti impollinatori è più stabile ed esteso nel tempo. I fiori trattati attirano molto di più le Api mellifere e per questa ragione essi sono visitati molto più spesso da questi insetti che migliorano sensibilmente l'allegagione con la logica conseguenza di una sostanziale e maggiore resa produttiva delle coltivazioni.

### VANTAGGI

**sulFIORE®** è uno stimolatore di impollinazione che si spruzza sulle colture che sono in fioritura e la sua particolare formulazione (microincapsulazione) si protrae per lungo tempo creando tutti i presupposti per una maggiore allegagione dei fiori. L'attrattività non è solo rivolta alle **Api** ma anche i **Bombi** ne sono coinvolti. Un maggior numero di visite rivolte ai fiori dagli insetti impollinatori comporta:

- Migliore allegagione;
- Maggior numero dei semi nei frutti;
- Aumentate dimensioni dei frutti;
- Significativo aumento delle produzioni.

MODALITÀ DI IMPIEGO		
Coltura	Dosi d'impiego	Note
Fruttiferi, Actinidia, Ortaggi vari e piccoli Frutti	2 L/ettaro utilizzando 500-750 di acqua	Vedere l'etichetta
Colza	1 L/ettaro utilizzando 100 L di acqua	

### PRECAUZIONI D'USO

**sulFIORE®** deve essere applicato all'inizio della fioritura o al più tardi prima della piena fioritura. Il trattamento deve essere ripetuto solo se si è verificata una pioggia consistente dopo l'applicazione.

**Alberi da frutto (Melo, Pero, Pesco, Nettare, Susino, Albicocco Ciliegio, Actinidia, ecc.), Ortaggi vari (Anguria, Asparagi, Bietola, Broccoli, Carciofi, Carote, Cavolo, Verza, Cetrioli, Fagioli, Fagiolini, Fave, Finocchi, Fragole, Insalate, Melanzane, Melone, Patate, Peperoni, Piselli, Pomodori, Porri, Radicchio, Spinaci, Zucca, Zucchini, etc.) e Piccoli frutti (Mirtilli, Lamponi, More, Fragole, ecc.):** 2 L/Ha di **sulFIORE®** diluiti in 500-750 L di acqua da distribuire sull'intera superficie interessata.

**Colza:** 1 L di **sulFIORE®** in 100 L di acqua. Irrorare il perimetro del campo per una fascia di alcuni metri (4 o 5 m.). All' interno del campo irrorare delle fasce. È sufficiente irrorare circa il 25-30% del campo distribuendo in questo modo la dose di circa 0,5-1 L/Ha di prodotto.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.