LINEA TECNICA
DIFESA E FITOREGOLATORI
CARCIOFO

www.agrimix.com

BBCH	6-13	14-19	47-48	49-50	52-53	57-59
UTILIZZO / FASE	Emissione radichette 7-10 e 15-20 giorni post-trapianto	Foglie visibili 4 - 6 - 9	70-80% Massa fogliare raggiunta	Formazione infiorescenze. Capolino non visibile	Allungamento stelo. Capolino visibile	Capolino al 70-90% del volume finale

Oidio		USBERGO + SPINNER WG				
		USBERGO + NOIDIO® GOLD 10 EC				
Altica, Afidi, Depressaria, Tignola		NEO + DELTAMIX®				
Diserbo	SECCHERBA® Respect					
Fitostimolazione			GIBGRO® 20%			

Avvertenze e consigli utili: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Chi impiega i prodotti fitosanitari è responsabile degli eventuali danni causati da un utilizzo improprio degli stessi.

LINEA TECNICA
BIOSTIMOLAZIONE E NUTRIZIONE SPECIALE
CARCIOFO

www.agrimix.com	BBCH	6-13	14-19	47-48	49-50	52-53	57-59
	UTILIZZO / FASE	Emissione radichette 7-10 e 15-20 giorni post-trapianto	Foglie visibili 4 - 6 - 9	70-80% Massa fogliare raggiunta	Formazione infiorescenze. Capolino non visibile	Allungamento stelo. Capolino visibile	Capolino al 70-90% del volume finale
	Biofertilizzazione	EndoPlus					
	Sviluppo vegetativo		ERCOS BIO + ECOALGA / ECOALGA crema				
			ECOALGA crema + EndoSpirillum + ERCOS BIO				
	Anticipo e concentrazione della produzione			ORTO + ECOALGA crema	SuperCalibro + ECOALGA crema + CaK Complex		
	Induzione di resistenza		Ortosil+ + SAM Zn Cu + GLUCORAME+				
				NEOMA** + USBERGO**			

** In abbinamento agli interventi insetticidi e fungicidi