LINEA TECNICA
DIFESA E FITOREGOLATORI

POMODORO DA INDUSTRIA

www.agrimix.com

BBCH	12	19-29	51-59	61-69	71-79	81	82-89
UTILIZZO / FASE	Trapianto	Sviluppo fogliare e formazione germogli laterali	Emissione delle infiorescenze	Fioritura	Sviluppo del frutto	Invaiatura	Maturazione dei frutti

Peronospora, Batteriosi	USBERGO + IRAM® 20 WG / GOLBEX WG / DAUPHIN 45 / rameAzzurro® 50 BIO
Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella, Cladosporiosi	USBERGO + AGRIDIF 250 / DAMAN
Botrite	PRETIL®
Oidio	USBERGO + NOIDIO® GOLD 10 EC / SPINNER WG
Aleurodidi	NEVIOM® + ABANTO®
Afidi, Altica, Cavolaia, Dorifora, Lepidotteri, Nottue, Tentredini, Tripidi	NEVIOM® + PLINTO® / DELTAMIX® 25 / MARKATE® PLUS 100 CS
Diserbo	SECCHERBA® 600SC
Fitostimolazione	GIBGRO® 20%

Avvertenze e consigli utili: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Chi impiega i prodotti fitosanitari è responsabile degli eventuali danni causati da un utilizzo improprio degli stessi.

LINEA TECNICA
BIOSTIMOLAZIONE E NUTRIZIONE SPECIALE

POMODORO DA INDUSTRIA

www.agrimix.com

BBCH	12	19-29	51-59	61-69	71-79	81	82-89
UTILIZZO / FASE	Trapianto	Sviluppo fogliare e formazione germogli laterali	Emissione delle infiorescenze	Fioritura	Sviluppo del frutto	Invaiatura	Maturazione dei frutti
Biofertilizzazione	EndoPlus oppure EndoSpirillum						
Nutrizione Speciale			ECOALGA crema + CaK Complex		ECOALGA crema + CaK Complex		ECOALGA crema
		ERCOS BIO				CaK Complex	
Anticipo maturazione aumento grado Brix						Vangog	
Allegante				FLOR + ORTO			
Accrescimento e uniformità di calibro dei frutti					SuperCalibro*	bio-att	
Induzione di resistenza	SAM Zn Cu + GLUCORAME+		Ortosil+				
		NEOMA** + USBERGO**			NEOMA** + USBERGO**/ rameAzzurro 50 BIO		

* Per massimizzare il risultato 24-48H prima di ogni intervento con SuperCalibro consigliamo una fertirrigazione di PK (es. fosfato monopotassico) in ragione di 20-40 Kg/Ha unitamente ad un incremento delle irrigazioni nei tre giorni successivi al trattamento.

** In abbinamento agli interventi insetticidi e fungicidi