


SPINNER WG

Novità 2023!
Etichetta estesa
con numerose colture!

FUNGICIDA SISTEMICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI PER POMACEE, DRUPACEE, VITE (DA VINO E DA TAVOLA), CEREALI (FRUMENTO, ORZO), ORTAGGI (MELONE, ZUCCHINO, PEPERONE E CARCIOFO, POMODORO, COCOMERO, CETRIOLO), TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE:	Tebuconazolo	25%
FORMULAZIONE:	Granuli idrodispersibili	
CLASSIFICAZIONE:	Attenzione 	H361d; H319; H410; EUH401
REGISTRAZIONE:	Ministero della Salute n. 13166 del 24.08.2006	
CONFEZIONI:	Astuccio da 1 Kg	Cartone 10x1 Kg



Prodotto originale NUFARM

NOVITÀ!

CARATTERISTICHE

Fungicida in granuli idrodispersibili ad azione sistemica preventiva, curativa ed eradicante. Lo **SPINNER WG** viene rapidamente assorbito dagli organi vegetali trattati e dopo la penetrazione traslocato attraverso lo xilema, in direzione acropeta, su tutta la vegetazione raggiungendo e proteggendo anche quelle parti eventualmente non raggiunte dalla miscela fungicida o sviluppatesi dopo il trattamento. Lo **SPINNER WG** agisce sui patogeni bloccando lo sviluppo del fungo interferendo nella biosintesi degli steroli siti nella membrana cellulare.

VANTAGGI

Il rapido assorbimento dello **SPINNER WG** da parte della vegetazione consente il suo impiego anche in concomitanza ad andamenti climatici bizzarri (assa frequenti in primavera) caratterizzati da frequenti piogge in quanto il prodotto, penetrando all'interno delle piante, non è soggetto al fenomeno del dilavamento. Il prodotto non interferisce sull'entomofauna utile e sulle api. In presenza di questi insetti pronubi è possibile trattare in quanto nei loro confronti non c'è nessuna azione tossica e/o repellente.

MODALITÀ DI IMPIEGO					
COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Melo	Ticchiolatura e Oidio	50	750	3	1400-1500
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	50	750	3	1400-1500
Pesco e Nettarine	Monilia, Botrite, Oidio	75	1125	2	1000-1500
Albicocco	Monilia, Botrite, Oidio	75	1125	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia, Botrite	75	1125	2	1200-1500
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	75 50	1125 750	2	1000-1500
Vite da vino e da tavola)	Oidio	40	400	3	1000
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini, Pomodoro, Peperone, Carciofo	Oidio	50	500	4	800-1000

MODALITÀ DI IMPIEGO					
COLTURE	PARASSITA	DOSE massima (g/hl formulato)	DOSE massima (g/Ha formulato)	TRATTAMENTI (numero massimo)	VOLUME D'ACQUA (Litri/Ha)
Frumento, Orzo	“Mal del piede”, Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria, Fusariosi	—	1000	1	—
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rizoctonia solani</i>	—	1500-2000	2	600-800

CONSIGLI UTILI - COMPATIBILITÀ - INTERVALLO DI SICUREZZA

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro. Lo **SPINNER WG** non è compatibile con i prodotti alcalini come la Poltiglia Bordoiese, i Polisolfuri, Calce, ecc.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DI POMODORO, PEPERONE, CETRIOLLO, ZUCCHINO; 7 PER CARCIOFO, COCOMERO, MELONE, PESCO E NETTARINE, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO; 14 PER LA VITE, MELO E PERO; 30 PER FRUMENTO E ORZO.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.